

# فقرات دورات جلدية

بسم الله الرحمن الرحيم

- هاد أسببه بتجميع للدورات شكك فقرات  
أكثر من فقرات كاملة

- شامل لدورة 15 - 16 - 17 أساسية فقط  
بالاضافة الى كام سوال

- يوجد إشارة ☆ عند الخيارات التي جاي  
بالدورات والتي حاجبوا إشارة ☆ هو خيار صنفق  
من الغفرة في حال قرر الدكتور بغير بالخيارات

- بعض الاسئلة في جنبها (وليس ... إلخ)  
هون للتنبيه فقط أنو الخيار الذي اجا هو الخيار  
الخاطئ بدل الخيار الصحيح المكتوب هون  
- بالتوفيق إن شاء الله

K . S

# الباب 1

- لطافة تزانك : للكشف السريع عن :

★ - الفطام الشائع .

- آفات حورية ناهجة عن أفعال الحشرات الحليّة

- سرطانة قاعدية الخلايا

- حمري الفطور المباشرة :

★ - زرع على وسط سابورو ← أساس ← معرفة نوع الفطر المسبب

★ الآفات النازة

- التآكلات ← ضمادات طبية + هجمات  
القرحات (حالة موضعة) (حالة واسعة)

- اختبار الصفوذية : *diascopy* ★

★ - لتحيز الآفات المصطبغة المعوية عن الخبيثة

- تصنيف الآفات الترفية عن الوعائية (التهابية) عن غير الوعائية

- عناصر الاندفاع الثانوية :

- الوسوف - الجلبات والقشور - السحجات

- التآكلات والقرحات والشقوق - التحرز  
★ (البثرة ليست ثانوية)

- المظاهر :

★ - الانتثار : مظاهر وزمية (لا يوجد حويصل)

- المظاهر العصبية : مظاهر في قمتها حويصل

- تبكّل الجلد :

★ - ضمور خلد

★ - اضطراب تصبغ

★ - توسع شعيرات

- مثاله : التهاب الجلد الشامي المزمن



## الجلد

- يتقبل الجزء من الجريب بين البصلة والحد العلوي للفرد الداخلي
- جذر الشعرة مع كودورة نحو (ليس كامل الجريب)
- نحو الشعر يعتمد على الفعالية الانتقائية للخلايا (وليس الحلاقة)
- حلاقة زيرو = زيادة تشكل جريبات

## ترافق الفرد الزهمية راثما مع الأشعار ماعدا:

- خدد ميبو صوس بالأصقان
- خدد تسيون على القلفة
- خدد زهية - يقع فور ديس على القسم القرمزي للشفة ومخاطبة الفم
- مديبات مونتغري على لعوة الثدي للمرأة

## الفلا غرين: خيوط

- ياعد من تكمل الكيراتين وتشكل غلاف من القرنتين البشروي

- المحافظة على رطوبة الطبقة المتقرنة

- المبيعات الصفامية: = جيمات باشيني
- مستقبلات الضغط والمس

- الطبقة المتقرنة تحتل الدور الحجازي للجلد
- الحماية من الأذيات الميكانيكية: كافة الطبقات + ترا لجها المتماثل
- وظيفة مناعية: خلايا لانغرهانس والخلايا المتقرنة

## الفرد المفترزة:

- تعصيب ار ريناليني (ليس كولوني)
- تعيب رائحة عرق كريمة
- لادور طفرزاتها عند الانسان (لا تتحضر بالمرارة)

## - يستخدم العلاج العرفاني PUVA

- فطار فطراني

- صراف

- بهافت

★ (لا يستخدم من الذائب الحماص القرصية)  
ولا في الملقح

## - الفيت الجروسي الطبيعي للجلد

- وتديات

- بيفاد دويرية

- العنقوديات

★ (المبيعات البنية ليست من الفيت)

## - الخلايا الميلانية :

★ - ترتبط مع الخلايا المقترنة عن طريق استطالات البصمات الصبغية

- لا يختلف عدد الخلايا حسب العرق وإنما يختلف حجمها

## - العلاج القرصية :

- التآليل - اللسان الجارية - تقرانات صلبة - سرطانية قاعية

- صبيوم مقع - طياد ماري

( لا يستخدم في الميلانوم )



## الباب 2 أخصاج الجلد

### التهانينا الجلدية

- العلاج: يفوضني بالآفات القليلة أو المفردة: أملاح الانتحوان  
- عام " المتعددة: أملاح الانتحوان

غلوي نعيم  
بنقوس قام

المنتشرة

- التهانينا الجلدية واحدة من الأشكال الاربعة \*

- الشكر للمربي يزمن سنتين حضنته 8 شه

- الشكر للطبيب الربيعي أنقذ من المربي 6 شهور و 8 حضنته أقل 4 أسابيع \*

- تزن الآفة أو تنكس وتطهر أشكالاً دوائية \*

- التهانينا الجلدية ~~الجلدية~~ الطفيلية: اصابة مشوية عند الأطفال \*

### الحفرة

- تسبب العقديات A فقط \*

- شكل خاص ومميز لاتها بالسليم الخلوي (يصيب الارفة والتم الضفي)  
للسليم تحت الجلد

حالة سريرية: مبررة: اندفاع حملي واصنع الحور وزعي على الخد  
مع ترضع ضروري صندعة ايام

- القوباء: التقوبؤ: تصيب ثانوي \*

- القوباء الالفةقية (المعدية) (الشائقة)

- تسببها ذهبية وعقدية A \*

- قد تحدث أعراض عامة \*

- القوباء الفقاعية

- تسببها الذهبية \*

- لا يوجد أعراض عامة

- الفقاعات تبقى يومين ثم تنزف \*

## - الثأليل المسطحة :

- حطاطات مسطحة فلساء
- تنتظم بشكل خطي
- تصيب الأطفال والبالغين
- التوضع المفضل الوجه وظهر اليدين
- لونها لون الجلد مائل للبني

## - العنقوريات تسبب :

- قوباء بوكارت
- التينة الشائفة
- الدمل

## - الجمرة الخبيثة مسببة بـ عصيات الجمرة \*

## - الحمرانية : تسببها البكتيريا الحمرانية المخاتلة

- آفة فوسية (تنتقل من الحيوانات) \*
- تتوضع على اليدين (وليس الشا) \*
- سريرياً : تورم أحمر فوسية يشفى تلقائياً
- لا يوجد أعراض عامة \*
- العلاج : بنسيلين واريثرومايسين (وليس ستيرويدات) \*

## - الأكتيما : القوباء السوداء \*

- تسببها عنقودية ذهبية + كفة بية A (منع مشترك)
- تتوضع على الأطراف الظلية بالذات
- سريرياً : قشرة سمراء سمكية
- العلاج : مراهم وصادات وتطهير الوجه العام
- ليست معدية بحدّة \*

## - التينة الشائفة :

- تصيب الحيية - مسبب المذهبة
- عدة بتور دوليين عدة دعامه \*

حيوت فيه

- ماركوما كوا بوزي تختلف عن الكلاسيكية في متعدي وقنطرة
- التهاب جلد مئي هـ بـ
- تزداد التفاعلات الجلدية الدوائية (الاندفاعات الوائية)
- هذا يطر من نطاق (وليه هو يطي)

المبيضات:

- ليست من النبت الطبيعي للجلد
- التهاب اللسان المعيني الناصف - اللسان الاسود المشعر - مبيضات
- السلق



## اللائ النطاقي

- اندفاعات قطامية وحيدة الجانب غير متناظرة \*
- تزداد نسبة الموت مع التقدم بالعمر \*
- يشفى أسرع عند الأطفال مع اختلافات أقل \*
- غير ناكس عارة \*

## الملبأ المعدي

- تصيب الأطفال خاصة \*
- حضانة أسابيع أشهر
- تسبب فيروسات الجدري Poxvirus \*
- علامات شبيهة مسررة قوى مارة متجينة بيضاء \*
- <sup>على الوجه</sup> تتوضع على أي منطقة بالجسد
- آفة حاككة

## التآليل الوردية - التناسلية - المؤنفة

- <sup>\*</sup> يظهر في (ليس خشن) \*
- تتوضع على جسم المصاب والخشنة وعلى الشرج والمهبل (وليس الوجه) \*
- لونها وردي بلون الجلد \*

## - الملوك :

- يصيب الجرب الشعري كاملاً والنسيج المحيط ( وليس فوهة الجرب )  
فقط
- تسبب العقوديات

## - قوباء بوكارت :

- تسببها العقودية المذهبية \*
- تنوضع على الوجه والفم والأطراف \*
- تصيب فوهة الجرب ( ليس القمع ) \*
- العلاج : ستيرويدات موضعية وقطران

## - الوزح :

- تسبب الوترية الدقيقة - يكشف عنه بأسعة وور \*
- يصيب مناطق التنيات
- لطخات محددة حبيرا \*
- يرافقه الكوي والبقانة \*
- غير عرضي غالباً

## - الحزاز الحثري : يشفى دون تنزب \*

## - الافرنجي الثانوي : من اندفاعاته

- الوردية الافرنجية \*
- الافرنجية الحطاطية
- البثرية والتقرصية
- الأوعية الخفية
- ترقط الجلد الافرنجي
- الحاصة الافرنجية
- الاورام القنبيطية الملحة : لقومات ملحة \*

## - الاختبارات العصبية للأفريقي :

- VDRL ممكن يظهر ايجابية كاذبة
- TPHA نوعي جدا " في VDRL ايجابي وTPHA سلبي (تراجع اللولبيات)  $\Rightarrow$  ايجابية كاذبة \*
- TPI تثبيت اللولبية : حسب الاجراء \*

## - القرح الافريقي : الافريقي الأولي

- قاعدة مرتشحة صلبة (غضروفية) \*
- ملحم ، رطب لماع \*
- غير مؤلم \*
- حدود واضحة \*
- وعيد عارية \*

## - الافريقي :

- الافريقي الولادي ينتقل للجنين بعد الشهر الرابع \*
- الكف من لطافة الفم (آفات الفم) غير مؤكدة وغير دقيقة \*
- البنسيلين العلاج الأفضل

## - التهاب الاحليل غير البني :

- علاجه : تتراسيكلينات و فلوكوروليدات : مثل دوكسي سيكلين أو اريثرومايسين أو ازيثرومايسين \*



## السيدان البني

- تسبب النسيبة البنية
- يصيب المذغشية المخاطية البولية التناسلية (يمكن أن يحدث خارج الجهاز التناسلي لهولي)
- حضانتة : 1 إلى 15 أيام \*
- عند الذكور أعراض واضحة شديدة وعند الإناث خفيفة ولا عرضية
- عند الكبار : لا يصاحبه ألم هبل \*

## الجرب :

- الحضانتة 2-3 أسابيع \*
- حكة شديدة ليلاً
- تموت القارعة المسببة بعد 3 أيام برا الجسم \*
- لا يصيب الممرن الوجه والفروة وأعلى الظهر (الرقبة أيضاً لا يصيبها) \*
- الأنفاس آفة نوعية للجرب
- يصيب تشخيصه عند الملتزمين بقواعد النظافة \*
- آفات حفرية تستمر بعد العلاج الناجح \*

## فصل الرأس :

- الحركة العرض الرئيسية

- يسبب تقوؤ وتجي ثانوي \*

- تعامل مركبات اللفاف الطريق العام + ملائيم و بيرسترين

حنا رفا على

\* العصبان معدية لوتو صفت في أي مكان على مقببة الشوكه \*

## الحلأ البلي : HSV

- حمة الحلأ البلي 1 : الفم والجلد : أطفال \*

\* 2 : تناسلية : بالفتن \*

- مؤولة عن صوت :

- التيفت الحلية - هذا للمصاريف - الراحى الحالى

- التهاب الملقحة والقرنية الحالى - الاكترية الحلية (الانقاع الحاقى كاجوزي)

- الحماص الصفري النكة

- ينقل للوليد أثناء الولادة

- Paoua, Herpes - تسبب افهام كافتة \*

## - سمفطة الأظافر:

- السعوية الحمراء والبسوية الذهبية
- تبدلات لونية ثم تشوه الأظفر ثم زيارة تقرن \*
- في القدمين أكثر من اليدين \*
- تلون النهاية الحرة للأظفر في الجانب <sup>تلف</sup> يتشوه الصفيحة الظفرية خشن - زيارة تقرن خشن
- انفكك الأظفر

## - الطبقة الفطرية (فطرية) Id

- ارتكاس جلدي في سياق الأمراض الفطرية الالتهابية \*
- (الشهدة - سعفة القدم)
- لانتبه الآفة الأصلية الأولية \*
- لكنها تزول بزوال الآفة الأولية \*

## - النخالية المبرقشة

- الوبيفاء
- يقع ما بين الحدود وسفينة مختلفة الألوان \*
- عوامل مؤهبة: - مناطق حارة غنية بالدهن ورطوبة \*
- استعداد وراثي وعوز مناعي \*
- زهم \*

## - رداء الثنيات الخشائري: \*

- حماس وتآكيد رطبة
- وصور الوائل
- حافة مرتفعة فضالة



- الفطور المسببة لقطارات للبرازيلية <sup>\*</sup> Dermatomycoses
- الثعوبية
  - البشورية
  - البوريفاء

- سيففة القدم :**
- تصيب الرياضيين : قدم الرياضيين <sup>\*</sup> (وليه الأطفال)
  - الشكل المزمن : الأكثر شيوعاً : أصابع القدم <sup>\*</sup>
  - الشكل حفره التقرن المزمن ، تناسية الجانب (قدمين مع يد) <sup>\*</sup>
  - الشكل الحويصلي الجانب الثعوبية الحمراء <sup>\*</sup>

- جيانوتي كروستي**
- التهاب جلد الأطراف الحطاطي الطفلي <sup>\*</sup>
  - عادة بعد 2 سنة <sup>\*</sup>
  - فيروسات الكوكساجية
  - على الأوجه الخارجية للأطراف <sup>\*</sup>
  - الإلتهين
  - الوجه (لاتصيب الخنم)
  - حطاطات حمامية <sup>\*</sup> حويصلية <sup>\*</sup>

- السففة الجازة :**
- الأفضف انثأراً في خودة نحو الشعر (لاتترك ندبة) <sup>\*</sup>
  - معدية وبائية

## الباب 3 التهاب المفاصل التهابية

التهاب المفاصل الالتهابي: آفة غير سليمة (قبل سرطانية) \*

### المسببات الالتهابية المفصليّة \*

- الاندفاع المفاصلي حديد أشكال - الأكل المفاصلي
- الحصان الوقوي
- الشرى الشمسي
- التفاعلات المناعية السمية
- " " الأروحية

### التأثيرات الحادة لأشعة الشمس UVB

- الدبغ \*

- حكة في البشرة \*

- حمامي حويصلي حفاقي \*

- تثبيط مناعي - TC \*

- تركيب D

### الاندفاع المفاصلي حديد أشكال: ملاحظة

- عند الساعات \* - يشفى دون ندبات \* حكة
- اندفاع الربيع الفتوي هو إصابة حثارة الازن عند الأطفال - تظهر بعد 4 ساعات - 4 أيام

### الشرى الشمسي

- تفاعل سريع متواسط ب  $E$  و  $g$  \*

### الأرج المفاصلي

- وتسبب آفة: الالتهاب وكبدية - فينوتيازينات - مفعولات \*
- (أوليس فيورم كوما رين)

## - الجلد المصنعي :

- المزاريعة والنجارة : الرجال \*
- تحك واصطباغ للجلد
- تزداد خطوط الجلد وضوحاً \*
- يتوضع على الرقبة \*
- يحدث بسبب التعرض للشمس \*

## - الشرى :

- ارتكاس نحو البرد
- آفات همامية وذمية فزقة \*
- يتوضع على : - ظهر الأصابع في اليدين والقدمين \*
- الأنف والأذنين
- موريلية وفقاعية وتقرحات : في الحالات الشديدة
- تتكرر بالطقس البارد وتزول بالدفء (ليس آفة عابرة) \*

## - الثفن : الممار

- لبس الأحذية الضيقة
- التوضع : - ظهر الأقدام : صلبة
- بين الأقدام : لينة
- كتلة صفراء اللون مركز مخروطي نافذ مؤلم لونها أحمر \*

## - الوذمة الوعائية :

- ليست حادة



## - السحبة الصنوبرية

- غالبية المعرضين طارة محسنة تظهر عند علم الإصابة \*
- تظهر إلاصابة بعد عدة ساعات (بين 48-72 ساعة) \*
- ليست حادة
- سريريًا غالبية لحرق الشمس الشديد \*
- الإصابة تقتصر على المناطق المعرضة فقط \*

## - الانتفاخ الصبغي حولي الأنسجة

### - الرضفة الحمراء :

- مظاهرات هورنولية حمامية حادة \*

- وخرز وهرقان ومكة

- الرضفة العنيفة : خبز حادة

- الرضفة البلورية :  
- هورنولات رائعة تتفرق بسرعة

## الباب 4

- **الشرى** : كثير الشروع \*

- يترافقت مع : - الودعة الوعائية - ثلث الحالات \*
- الزأب الحمامي \*
- فقاع فقاعاني \*
- ديورنغ \*

- انتبارات حمامية حادة مفاجئة

- الشرى الفيزيائي :  
- كتوبية للبد : رحن بعد ثوان وذمة ويكون حالك \*

- شرى الصنف : وذمة بعد ساعات غير حالك لكن مؤلم \*

- شرى الشمس : نادر

- شرى البرد : أنشع شرى فيزيائي

- شرى الحرارة : بعد دقائق - نادر - ومعه الاستيدكوليد

- مضادات الهيستامين لا تقضي متفهاء تام \*

- آفة عابرة متقلبة وله عدة أسباب \*

الاندفاع الدوائي الثابت : - آمنة شائعة \*

\* - توطن : القصب - الشفتين - ظهر اليد

\* - لطفة حمامية مزرقة مدودها واضحة

\* - تضي لكن تترك تصبغ مكانها (ترك أثر)

الحامى عديدة الأشكال

\* - مغطيات سريرية ونسجية مميزة

\* - يوجد آفات مخاطية (أي لا تنفخ عن المخاطية)

\* - آفات هدفية يسببها HSV صد السيلو

استيفن هونون :

\* - هو الحامى عديدة الأشكال الكبرى

\* - ترافق مع أمراض عائلية سيئة

- آفات هدفية غير منتظمة ومطحة (لا مخاطية)

\* - إصابة المخاطية مطرقة

- داء لايك : الأسباب دوائية غالباً



## الباب 5 - الأمراض الأكثر شيوعاً

### التهاب الجلد التأتبي: الأكثر شيوعاً بينية \*

- \* يترافق جلد جاف وحكة شديدة - الرضاعة: الوجه مغطى بطفح
- \* تكثر أضراس العنقوديات - الطفولة: ثنيات الطافية (دون تحرز)
- \* مضاعفاته الأكثر شيوعاً الحساسية - البلوغ: تحرز ثنيات
- \* مرض محدد وراثياً لا يشفى + النخالية البسيطة \* (وليس الحدية)
- \* ارتفاع IgE الحساسية + الاندفاع صمغى الشكل لكابوزي
- \* تتفاقم مع العمر - المظاهر حادة بالطفولة، مزمنة بعد البلوغ \*
- \* تبدأ بعد السنة الأولى \*

### أكثر شيوعاً حساسية التقرق:

- هورمونات فتناظرة على قاعدة سليمة (وليس قاعدة صمغية) \*
- يزداد حدوثها ونكسها بالاضطراب الحارة \*
- تظهر في الرضعات والأطفال وجوانب الأصابع \* (أحياناً تكون في
- تصيب جميع الأعشار (نادراً عند الأطفال) \*
- العلاج: ضمادات ثم مستحضرات موضعية وجهازية

### الأكثر شيوعاً اللانحسية: أكثر شيوعاً الحفاف

- على الساقين والذراعين واليدين

- الحزاز البسيط المزمن: التهاب الجلد الحسبي الحسبي \*
- استجابة للقرص وفرك الجلد للتكرار \*
- أحياناً يتركب كل الخلل (غالباً) \*
- حالة شديدة - ليس حزاز مطح \*
- مافي شبة ويكحل \*

## الصفحة الأمامية :

- خضع جرثومي ثانوي موضع \*
  - الموثبه له : - أكر يماضيه (التعاجضي) \*
  - صراف \*
  - أطفال - بدء البلوغ
  - لطخات لحرية بيضاء لا تؤذي الأثر \*
  - و صوف و قشور ملتصقة بالأشعار \*
  - لا تؤذي الأشعار
- ## التعاب الجلد المشي
- تسبب : - الو بيفاء البيضوية \*
  - يسبب أحمرية \*

## التعاب الجلد التماسي الأرجي

- النيك : النساء \*
- الكروم : الرجال \*
- الفورم ألدهيد : مستحبات القعيد : ناد
- الكوبالت : رجال
- تصاب الجلد حول الفروة و أصبغة الشعر و هيبة المناطق المجاورة \*
- لا تصيب الفروة
- طرد الأظافر : الوجه و الأضفان (ليس الففر) \*

## الأكثر ربحاً :

- تفاعل التهابي لا نوعي نحو عوامل مختلفة \*

- هورمونات بشرية \*

- وزنه **بين** الملاميا البشرية ➡

- 25٪ مرض الجلد = هم أكثر ربحاً \*

- علامات الازمان : الشواك - فرط التقرن - تضاد القنازع - و صمغ في التبدلات

الالتهابية

## التهاب الجلد الحفاضي :

- التهاب جلد تماسي تحريشي (ليس فرط حس) \*

- مصاحبه لامعة وهورمونات

## الأكثر ربحاً اللاهنية :

- على الفروة وعجري السمع - الصدر



# الباب ٦ المبادئ المطاطية الوصلية

## الصداف: علافة او مستن

المعدجات العافة: Cyclosporin - PUVA - Methotrexate - Acitretin  
اضافة إلى الصادات والعلاجات الحيوية المناعية

- العلاجات العوضية: مركبات الصدف والبول
- امكن القوضع
- المرفقين والركبتين
- خروعة الرأس
- الاظافر
- المنطقة القضية
- أظفر أشكال: الأصرية الصدفية
- اضفرا ب بالتمايز الخلوي (غير سوى)
- قطرات الفهم
- انترالين (ديترانول)
- كالسيوترول - Tazarotene
- ستيرويدات
- علاج ضوئي UVB

## الصداف النقطي

- اطفال وياضين
- آفات صغيرة - لا أعراض عامة
- الجذع والأطراف - مرتبط بالعقديات

## صداف الأظافر: يتظاهر ب:

- بقعة الزيت
- وهبات
- ابيضاض
- بؤع صفر
- فرلة قرن تحت الظفر
- انفال الظفر
- يتظاهر غالباً بالتنقر (أو كثر تعبيراً)
- وشيوي

التيالية الوردية آفة . بقية . وصفة \*

- آفة بقية (طفية) حمامية وسفينة حادة حدة لذاتها
- لسبب الأعمار الشابة بالربيع والخريف - منظر شجرة عذرا طيلار \*
- سببها الأسماء مجهول (أضاحه خالصة) (ليس واضح سببها) \*
- مائة شريفة : طفل 10 سنين بالخريف يقع ولغات بلها مرضنة
- مضية على وجه غير مريحة مع atopy في خالية وردية
- ~~منظرة~~

التيالية الحمراء : - شفاء خلال 3 سنين - سبب مجهول (وراثي) - صفت الأصعية

الحزاز المسطح : يصيب الجنين بين 30 60 سنة \*

- ~~جالت~~ - مزمن - شائع - علامات بقية مضلة لاصعة \*
- يصيب : الجلد - الأغشية المخاطية - الجريبات الشعرية - الأنف \*
- مظهر تشرش ووصفي معيز وسري \*
- شبكة ويكهام بالإصابة الجلدية (خضوط شبكية)
- إصابات الفم شائعة \* (المكد القرعي)
- إصابة الجريبات بالفروة في حاصة ندبة \*
- الشك الخلقي : حفة القصب \*
- الحزاز المسطح على الرافعين والأفصحين في خير حال

تقعد الوسموني : صراف > نفاث ثنيات صفى و تزداد : الأصعية الهدافية

- الصراف البشري  
- تخالفاً ثانوي على الرأسمالية والأفهامين

- ثمرات حقيقة معممة غير جبرية \*
- لا يوجد أمران عامة \*

- الشواك الأسود

- الخطات مصطلفة زخابية \*
- يتوضع على مناطق الثنيات - الرقبة - المصن
- نخط ورأي بالطفولة \*
- نخط خبيث شديد - نخط ذاتي (كازب) : الأستيع
- مع اليدنة

- المبدعات الحزازانية

- للخط : الأطفال \* - أمداً الحراف

- الدقيق : القصب : الزراعية - العطن \*

- التصليبي الصنعوري : رصيص الملدو الأغنية المفا طبة المية الأغنية  
فقط



## الباب 7\* أعراض النسيج الصائم

- تصلب نسيج بالجلد  
القشعية: النساء 20 - 40 سنة (قد يحدث بأي عمر)  
- الخطية: الأشيع بالأطفال\* (تج بالعين)  
له صلبة السيف له صغره نصف الوجه  
له حاصة شربح

- الزأب\* الحمامي القريبي: سليم عند النساء أكثر 40 سنة  
- منظر الفراشة

Crest - سمى باسم العالم اليه الكثرة X ضياء فاحش

## الباب 8

- <sup>هنا</sup> التعامي العقدة : الناء أكثر 2 - 40 منه
- على الطرفيت الفليب : الوجه الأمي للماقبت \*
- يوجه أعراض عامة \*
- تنض بعد أسابع بدون ندبة \*
- تظاهرة باكرة للساكوتيد (لكنه ليس أشيع أسبابها) \*
- هي ارتكاس نحو العقديات فاصدة التعاب البليو \*
- تلك الحالات : دون سبب واضح \*
- تنض بطريقة الكدمات + يوريد البوتاسيوم \*
- مماصة تقاعلية \*
- التعاب مبلية شحي \*
- الاندفاع العدائي خير مأسب \*
- الانرضاعات العدية الشكد

مؤلمة

= الفقاع الشائع : في كل عام 30 - 50 سنة

(مخيو شائع ت)

- لطفنة ترانث

\* فقاعات روضة سريفة التمرق أرضية سلبية

- غير صالح

- سريفا : فقرات مرمونة في مخاطبة الفم

\* سيدة آفات انلا فية مؤلمة في الفم من أشهر

\* يوجد خلال أسواق

\* فطر وصيت أسواق الفقاع

= فقاع فقاعاني : رصيب المسنين

- فقاعات متوترة لا تتمرق أرضية هامة (سيت)

(السيت عند المبرة م) عديها الا فكل

- حاله

- لا يوجد خلال أسواق



- الكلف : عند النساء (يصيب الرجال)

فرط تصبغ بشروي أرمي

- يقع بينية مدورة متناظرة غائبة

- النساء الحوامل

- زيادة محور وشايط الخلايا الميلانينية

- علاج : هيدروكينون

- على صب البثرة + الأدمة

- الخلية الميلانينية :

غائبة :

~~المهق~~

- البهاق

- المهق الجزئي

موجودة :

- الوصم الكاذب

- المهق

- الوصم

## السجدة السابعة :

- فرط تقرن تكاثرى احتباسي \*
- يظهر مع العلم الأول (الست مع الولادة) \*
- لا تصاب التنيات الكبيرة \* (المترتب بالحزن يصبها)
- جفاف جلد \*
- غائب (أكثر بحتاً تانية) \*
- يتحسن مع الكبر \*
- متناظر وسوفه رقيقة \*
- مورثة جسمية سائدة \*
- لا يترافق مع الطفد الكولودوني (الصفائى)

## السجدة الثامنة :

يصبه سريريا الشائع \*

## الفرقة السابعة :

الفرقة السابعة الحثاسي الصاغر \*

## الباب 12 وصحات وأورام

— ميلانوم الانتشار الطحي: هو الأشيع \*

— خواص الطحونة للميلانوم: وصحة عن التصنع - وصحة لادر عملاء \*

— الميلانوم الشبكي الحيد: (وصحة سبيتز Spitz)   
 - غنية بنيجلا \*

— وصحة سوتون \* وصحة هاليد \*

— وصحة بيكر: (ليست وصحة هاليد) \*

— فرد تصنع أعلى الكف مع أشعار عند الذكور مع البلوغ \*

— هالطة كبيرة وصيدة \*

— وصحات أدرية: \*

- وصحة أوتا

- " اميو

- " الزرقاء

- " المنفولية

— قاعدة الخرايا BCC: أشكالها

- العقدي المتقرع - المصطبغ - الطحي

- القشيمي - الكيسي

— عدم تفرن في الخرايا \*



الوعاء دوم التوتى : سليم  
- يصيب الجلد و الأغشية المخاطية

- لون أحمر غامق  
- مع العولارة يظهر ويختفي خلال العام الأول ثم  
يتراجع تلقائياً (يشفى تلقائياً)

- آفة على الوجه عقيدته ~~معدية~~ عزرفة  
مع ضخامة بيرة الرئة: ساركويد

- جبيوم قصير: سرب الزف

- بلي فيزيولوجي شحماني:

- ميدة: حطاطات محدرة على الوجه الأمامي للفتن  
بنفسي ومركب ملهف  
- عند النساء والكربين

- الجبيوم الحلقى:

- ظهر السيديت  
- مع الكري  
- الخزعة قد تشفى  
- كحي بارد + PUVA

العدد الشائع (التحالف) \*

- الآفة البدئية : الزفودان بعد المطاطات <sup>بدئية</sup>

- إزيليك أسيد <sup>لـ (التقران الجريبي)</sup>

- حيت بالعدد الثاني : 25 سنة \*

- في الأثرية الزهمية على الوجه و... (ليس طرا أي مكان) <sup>منه أهمية</sup>

- الكد الكبي : زكور  
(العدد الوردي) <sup>لـ (سيفه اشكاله)</sup>

الصاعق : فتيان \*

- تقرن عند فوهة الجريب

- يغيب بعد إيقاف الدواء

- الدابون فزيد  
ايسرينات  
تتراكلين

- زيارع الفرافرا الزهم \*

- المواعل السبية :  
- الوراثة - زيارع الزهم - الأندوجينات

- البروبونية العدية \*

خاصة غير ندبية :

- التعلية - خاصة الشد - خاصة نتف الشعر  
(التعلية الكاذبة فله فاطم)



(ليس تدريجي)

- **حاصبة لقعية** : \* فقدان مفاجئ للشعر في بؤرة مسيكة

- **فجعة الوجه** : \* آفة رجولية

- **الفرد المفترزة** : مؤولة عن الريحة الكريهة

- **سفعة الفروة** :

- السفعة الالتهابية : فطور حيوانية \*

- السحرة تنغي وتترك ندبة \*

- الانذار جيد لعودة نمو الشعر

- لا تقتصر الاصابة بسفعة النقاط الوردية الاطفال

- **السفة الأمتية** لا تؤذي الشعر

اللسان الأسور المشر\*

- ضخامة بالخليمات اللطيفة\* (اليس ضهور)
- تجمع هـ سوف
- تخريش مرص و تدفين\*
- لفحات سودا على الجزء الخافض
- علاج ب\* اعنولا ستيكر يونات الصوديوم

الخطاطات الشروية الحاكمة المحلية\*

- شائع جدا\* <sup>الاشع عند الماهل</sup> - حالك\* نسبة
- يحد بالثلث الثالث من المجل\* - لا يؤخر عالجنيث\*
- لا يميل للنكس\* - يصيب الحروسات\*
- ينزل بعد عدة أيام\*

نقص الحديد: حكة مضمرة - صمغ\*

(لا يصب حاصلة بفعية\*)

الركوية الصفراوية المحلية الراجعة: تؤخر عالجنيث\*

## الصفات

\* آفة تطف عفوياً : - ناليتورية  
- صفات

\* يود بالصف : - داء رابيه

\* تحدث النزبات : - الذئبة الحمامية القرصية المزمنة  
- الهد الشائع  
- الأكتما  
(الحامى العقدة لا تعقد تدربات)

\* ظاهرة كوبنر شائعة في : - هزاز مطمح  
- صراف  
- نآ ليد مطحة  
(غير شائعة بالوزح)

\* فقام الشائع : غير شائع

\* - دابون لعلج الكوام  
- الايفر مكنين جهازيا للجراب  
- مضتر ياكون علاج الاطليل أثناء السدون  
ليس بعده



- دمل عند الشباب  
- الأورامل موصفاً - علاج الورم

- آفة بيضاء : - وحة فقر الدمية  
- وحة سوتون

- الحلس الصبغى لاحتيا رفا له

- مرضن ذكوري : ضيعة الأنف

- وريابورث رفرى = صامى مرضنة هاجرة  
- صدسية دوكري = القريع اللب

- مسدة ٩٥ سنة : ائتسكا لا بالمفم مرضنة : فقاغ شائع  
- مسدة على وجهها صامى غير ثابتة بعدها اصسجت ثابتة  
النخالة  
= الوردي

- طفد ٦٥ سنين : بقعة خالية من الشعر والبلد سليم : ثعلبة

★ تحن صفاً - الحالك الشائع

x داربيد x بيوى بالصف

★ التهاب الشفة الظني : غير ملية - التقران المني : ملية

- الاقربى : اللويد ليس خسر ارتفاع - المد الشائع : الحويلد م غار x  
حنار فاطم

★ صراف الفروة لا يؤثر بالاشهار  
- الحفة الأصبية لا تؤذي الاشهار

★ يتفاقم بالتقرن الشمس : - ذاب صامى  
- صراف حلد صلبغ - برضيرا الحلد

- نظير الصراف x فاطم  
x Aph theal x  
صاير فاطم